

آبسه پری آنال

آبسه پری آنال عفونتی است که بدلیل تجمع چرک در فضای طبیعی اطراف آنوس مقعد و رکتوم ایجاد میشود.

علائم و نشانه ها

- ① درد شدید در ناحیه پری آنال، شایع ترین شکایت این بیماران می باشد.
- ② راه رفتن، نشستن، سرفه کردن و زور زدن باعث شدت یافتن درد میشود.
- ③ تورم (در آبسه‌های سطحی)
- ④ درد به هنگام لمس راست روده
- ⑤ درد ضرباندار
- ⑥ تب و دیگر علائم جدی‌تر در مورد آبسه‌های عمقی‌تر
- ⑦ درد به هنگام اجابت مزاج

باکتری‌های شایع مثل استافیلوکوک و اشرشیاکولی شایع‌ترین علل هستند. گاهی عفونت‌های قارچی باعث بروز این آبسه می‌شوند. آبسه‌های پری آنال گاهی با تب و سپتی سمی (ورود عفونت به خون) خود را نشان می‌دهند و گاهی باعث احتباس ادراری میشوند.

عوامل تشدید کننده بیماری

افراد مبتلا به بیماری گوارشی
تزریق برای درمان بواسیر داخلی
آسیب ناشی از نوک وسیله تنقیه
زخم
جسم خارجی
بواسیر بیرون زده

پیشگیری

- جلوی بروز یبوست را بگیرید
- از تنقیه خودداری کنید

درمان:

آبسه های پری آنال باید بلافاصله بعد از تشخیص، تخلیه شوند. تاخیر در تخلیه آبسه موجب افزایش اثرات تخریبی آن میشود. در بیماران پیر و بیمارانی که دیابت (قندخون) دارند می تواند خیلی خطرناک بوده و به سمت بیماری کشنده پیشرفت کند.

**در عمل جراحی ، محل آبسه
دوخته نمیشود و باز گذاشته
میشود تا بتدریج حفره آبسه
بسته شود.**



آبسه پری آنال

تهیه و تنظیم : سکینه شیریان با
همکاری دفتر آموزش پرستاری



شماره پمفلت : ۳۹

خرداد ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲

پس از جراحی، در زودترین زمان ممکن فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های عادی خود را از سر بگیرید.

۴- رژیم غذایی مایعات و نرم حاوی سبزیجات و فیبر دار برای راحتی اجابت مزاج استفاده نمایید.

۵- میوه های حاوی ویتامین ث استفاده کنید.

توصیه های بعد از ترخیص

۱- روزی سه مرتبه به مدت ۲۰ دقیقه در لگن آب ولرم بنشینید و سپس با پارچه تمیز خوب خشک نمایید، لباس زیر را مرتب تعویض کنید

۲- داروهای تجویز شده را طبق دستور مصرف نمایید.

۳- در صورت داشتن تب، لرز و بی حالی، بی اشتهايي و ترشح از محل عمل بلافاصله به پزشک معالج مراجعه نمایید. در غیر این صورت یک هفته پس از ترخیص جهت معاینه ی مجدد به پزشک مراجعه کنید. کمپرس گرم برای تخفیف درد مفید است.

در صورت احساس اجابت مزاج، از آن خودداری نکنید، حتی اگر درد داشته باشید. یبوست می تواند باعث افزایش فشارروی زخم محل جراحی شود .