

عفونت گوش

این عفونت معمولا در ساختمان گوش
میانی ایجاد شده و از طریق شیپور
استاش به قسمت های پایین تر
گسترش می یابد و معمولا بدنبال سرما
خوردگی و گلو درد و عفونت های رایج
دیگر رخ میدهد.

علائم بالینی:

-درد در گوش -تب -خروج ترشحات
از گوش (در صورت پارگی پرده سماخ)
-گریه بیش از حد و گرفتن گوش توسط
کودک - تحریک پذیری - اختلال در
خواب - اختلال در شنوایی و تعادل.

۱

درمان:

برای درمان این مشکل مراجعه به پزشک
ضروری است

از مصرف خودسرانه داروها جدا خودداری
کنید داروها را دقیق وبا توجه به مقدار
توصیه شده استفاده نمایید

در صورت استفاده از داروهای دیگر برای
بیمار به پزشک اطلاع دهید تا تداخل در
داروها بوجود نیاید.



۲

در برخی موارد این بیماران نیاز به بستری در
بیمارستان و دریافت داروهای وریدی دارند و
ممکن است پس از ترخیص نیز داروی
خوراکی برای آنها تجویز گردد .

از ریختن خودسرانه قطره ها و داروها داخل
گوش بیمار خودداری نمایید.
از فرو کردن اشیا و گوش پاک کن داخل
گوش پرهیز نمایید.

معاینات دوره ای توسط پزشک معالج
کودکتان ، باعث افزایش آگاهی شما
در موارد شناخت و پیشگیری از
بیماریهای ویروسی و میکروبی می
گردد.

۳



عفونت گوش

تهیه و تنظیم: زهرا رضاحسینی

منبع: کتاب مرجع پرستاری برونر

شماره پمفلت

اطفال

۵

تاریخ تدوین: زمستان ۱۴۰۴

کودکان سرمایه های گرانقدر
زندگی ما هستند.

مراقب سلامتی آنان باشیم

با تشکر از راهنمایی آقای دکتر علی اصغر زین
الدینی

متخصص کودکان ونوزادان



پیشگیری از بیماری:

- پیشگیری از ابتلا به سرما خوردگی.
- عدم قرار گرفتن در معرض دود سیگار.
- اجتناب از تماس با سایر کودکان مبتلا به سرما خوردگی و سایر بیماریهای عفونی.
- تغذیه با شیر مادر نوعی حفاظت شدگی در برابر عفونت ها است.
- عدم استفاده از بطری شیر در حالت دراز کشیده.
- عدم دسترسی کودک به اسباب بازی های آلوده.
- واکسیناسیون در برابر آنفولانزا در صورت بروز عفونت های مکرر گوش.

منبع: کودکان مالو