

فلوجارت شماره ۱

تشخيص زود هنگام سرطان دهانه رحم

ارزيابي زنان ۳۰ تا ۵۹ سال توسط ماماى آموزش ديده

شرح حال از نظر:

- خونريزي غير طبيعي واژينال^۱
- تشخات بيضوي واژينال
- درد هنگام نزديكي جنسي

شرح حال طبيعي

شرح حال غير طبيعي

وجود همه شرايط زير:

- گذشت بيش از ۳ سال از تماس جنسي
- گذشت بيش از ۱ سال از پاپ اسمير يا ۱۰ سال از تست HPV قبلي
- قرار گرفتن در گروه سني ۲۰ تا ۴۹ سال

بله

خير

- آموزش خودمراقبتي
- ارزيابي مجدد طي دو سال از نظر علايم مشکوک سرطان دهانه رحم^۵

نمونه برداري HPV و پاپ اسمير

نتيجه HPV منفي

نتيجه HPV از نوع غير ۱۶ يا ۱۸ مثبت همراه با پاپ اسمير طبيعي^۷

نتيجه HPV از نوع غير ۱۶ يا ۱۸ مثبت همراه با پاپ اسمير با نمونه نامناسب يا ناکافي^۸

نتيجه HPV از نوع غير ۱۶ يا ۱۸ مثبت همراه با پاپ اسمير غير طبيعي (ASGUS, ASCUS, LSIL, HSIL)

نتيجه HPV از نوع ۱۶ يا ۱۸ مثبت

تكرار نمونه برداري HPV و پاپ اسمير

نتيجه HPV منفي همراه با پاپ اسمير طبيعي

نتيجه HPV مثبت يا پاپ اسمير غير طبيعي

آمادگي هاي لازم براي کولپوسکوپي درخواست و تعيين نوبت کولپوسکوپي

- آموزش خودمراقبتي
- ارزيابي مجدد طي دو سال از نظر علايم مشکوک سرطان دهانه رحم
- نمونه برداري HPV و پاپ اسمير طي ده سال

علايم مثبت همراه با سابقه سرطان يا ضايعات پيش بدخيم
علايم مثبت همراه با توده در معاینه دهانه رحم يا شکم

صرفا علايم مثبت با معاینه طبيعي

- درمان دارويي
- ارزيابي مجدد طي دو هفته

بهبود علايم

پابداري علايم

درخواست ويزيت متخصص زنان

ارزيابي سوابق پزشکی:

- سرطان و ضايعات پيش بدخيم دهانه رحم^۲
- عوامل خطر مرتبط^۳
- تشخيص هاي افتراقي^۴

معاینه:

- شکم
- دهانه رحم با اسپکولوم

۱. خونريزي غير طبيعي واژينال؛ از جمله پس از نزديكي جنسي، در فواصل بين قاعدگي ها، پس از يائسگي
 ۲. ضايعات پيش بدخيم دهانه رحم: CIN, ASCUS, ASGUS, LSIL, HSIL
 ۳. عوامل خطر مرتبط؛ از جمله داشتن ارتباط جنسي با افراد متعدد، عدم استفاده از کاندوم و غيره
 ۴. تشخيص هاي افتراقي؛ سلطه در زنان پيش از يائسگي، عفونت ها مثل کلاميديا و گنوکوک، زخم هاي ناحیه تناسلي، التهاب سروسيکس، پولیپ رحم، خونريزي مملکزي رحمي، سرطان واژن يا رحم
 ۵. در صورتي که کمتر از يک سال از پاپ اسمير گذشته و نتيجه آن ASCUS, ASGUS, LSIL, HSIL باشد و بیمار هنوز کولپوسکوپي نشده باشد براي درخواست و تعيين نوبت اقدام کنيد
 ۶. تکرار نمونه برداري HPV و پاپ اسمير در عرض ۱۲ تا ۲۴ هفته
 ۷. تکرار نمونه برداري HPV و پاپ اسمير در عرض يک سال