

هیدروسل (مایع دور بیضه) چیست و چگونه درمان می شود ؟

هیدروسل مایعی است که اطراف بیضه را احاطه می کند و موجب تورم کیسه بیضه می شود. تقریباً از هر ۱۰ نوزاد پسر یک نوزاد به طور مادرزادی در بدو تولد دچار هیدروسل می باشد، اما اغلب آنها در طی یک ماه اول، بدون درمان بهبودی می یابند. علاوه بر آن، مردان نیز (اغلب بالای ۴۰ سال) به علت التهاب یا صدمه به کیسه بیضه، ممکن است به هیدروسل مبتلا شوند در پسر بچه ها معمولاً هیدروسل در طی یکسال به طور خود بخود محو می شود. اگر پس از یکسال از بین نرفت و یا به بزرگ شدن ادامه داد، نیاز به جراحی خواهد داشت. هیدروسل معمولاً دردناک نبوده ولی چنانچه فرد دچار تورم کیسه بیضه شود باید به پزشک مراجعه نماید تا علل دیگر همچون سرطان بیضه و حالات دیگر را بررسی نماید. بنابراین تمام مردان

تشخیص:

- آزمایش خون وادرار

- سونوگرافی

مبتلا به هیدروسل باید تحت سونوگرافی بیضه قرار بگیرند. در بسیاری از موارد، هیدروسل با فتق کشاله ران همراه است. در این موارد به علت ضعف دیواره شکمی، قسمتی از روده به داخل کیسه می رود که نیاز به درمان دارد جراحی خواهد داشت. کشیدن مایع هیدروسل در بچه ها بدلیل خطر عفونت به هیچ وجه نباید انجام شود. در بزرگسالان نیز اغلب هیدروسل خود بخود از بین می رود و زمانی نیاز به درمان پیدا می کند که آنقدر بزرگ شود که غیر قابل تحمل شده یا بد شکل باشد هیدروسل ممکن است یک طرفه یا دو طرفه باشد.

درمان: جراحی (هیدروسلکتومی):

هیدروسلکتومی برداشتن هیدروسل بصورت یک جراحی بدون نیاز به بستری طولانی، با بیحسی موضعی و یا بیهوشی عمومی انجام می شود. برای این کار جراح برشی را بر روی کیسه بیضه یا پایین شکم ایجاد می کند و ضمن تخلیه مایع، اصلاحات لازم را انجام می دهد.

برای این کار جراح برشی را بر روی کیسه بیضه یا پایین شکم ایجاد می کند و ضمن تخلیه مایع، اصلاحات لازم را انجام می دهد.

. هیدروسلکتومی ممکن است به قرار دادن لوله تخلیه و پانسمان حجیم بر روی ناحیه برش برای چند روز اول بعد از جراحی نیاز داشته باشد. استفاده از کیسه یخ بر روی موضع در ۲۴ ساعت اول پس از عمل، تورم را کاهش می دهد. جراحی هیدروسل در بچه ها بجای ناحیه کیسه بیضه باید با شکاف جراحی کشاله ران انجام شود.



هیدروسل (مایع دور بیضه)

تهیه و تنظیم : سکینه شیریان
با همکاری آموزش پرستاری
منبع : کتاب مرجع پرستاری برونر



شماره پمفلت :

۳۸

خرداد ۱۴۰۱ بازنگری خرداد ۱۴۰۲

در پسر بچه‌ها معمولاً هیدروسل در طی یکسال به طور خودبخود محو می‌شود. اگر پس از یکسال از بین نرفت و یا به بزرگ شدن ادامه داد، نیاز به جراحی خواهد داشت. کشیدن مایع هیدروسل در بچه‌ها بدلیل خطر عفونت به هیچ‌وجه نباید انجام شود.

در بزرگسالان نیز اغلب هیدروسل خودبخود از بین می‌رود و زمانی نیاز به درمان پیدا می‌کند که آنقدر بزرگ شود که غیر قابل تحمل شده یا بد شکل باشد هیدروسل ممکن است یک طرفه یا دو طرفه باشد.

به افراد جامعه پیشنهاد می‌کنیم در صورت بروز هر گونه مشکل در ناحیه تناسلی و ادراری سریعاً به پزشک مراجعه کرده تا درمان‌های لازم در موعد مقرر صورت گیرد .

آموزش های پس از ترخیص:

۱. افزایش مصرف مایعات
۲. داروهای تجویز شده را طبق دستور مصرف کنید
۳. از بیضه بند یا شرت‌های مخصوص برای بالا نگه داشتن بیضه استفاده کنید
۴. در صورت هرگونه قرمزی و ترشح از محل عمل به پزشک مراجعه کنید
۵. یک هفته بعد از عمل جهت کشیدن بخیه‌ها و معاینه مجدد به پزشک مراجعه کنید.

ایا هیدروسل باعث ناباروری میشود؟

هیدروسل به خودی خود عامل ناباروری نیست، اما ممکن است همراه با عوامل زمینه‌ای در بیضه مثل عفونت یا توده باشد که این عوامل، تولید یا عملکرد اسپرم‌ها را دچار اختلال می‌کند.