

درمان واریکوسل:


درمان دارویی ندارد فقط از طریق جراحی قابل درمان است که شامل بستن ورید های گشاد شده بیضه می باشد.

در موارد زیر توصیه به درمان واریکوسل میشود:

- در زوج های ناباروری که مرد در معاینه واریکوسل داشته وزن از نظر باروری طبیعی بوده یا اگر مشکل هم دارد با درمان قابل رفع میباشد. ودر آزمایش اسپرم از نظر تعداد- حرکت و شکل و تست های عملکردی غیر طبیعی باشد.
- احساس درد یا سنگینی در بیضه
- نوجوانانی که مبتلا به واریکوسل یک طرفه یا دوطرفه بوده ودچار کاهش رشد بیضه در همان سمت شده اند.

علائم:

رگهای بزرگ شده وپیچ خورده در کیسه بیضه ها که ندرتاً درد ایجاد می کند وممکن است درد در ناحیه کیسه بیضه ها با نشستن وپاشدن و فعالیت های جسمی شدیدتر وزمانی که به پشت دراز می کشید بهترشود.



تشخیص:

دقیق ترین راه تشخیص واریکوسل معاینه فرد توسط متخصص ارولوژی می باشد ولی در مواردی که به هر دلیلی شکی در تشخیص وجود داشته باشد میتوان از سونوگرافی داپلر (سونوگرافی رنگی) استفاده کرد.

واریکوسل چیست؟

بزرگ شدن رگها درون کیسه بیضه راگویند. واریکوسل یکی از معمول ترین دلایل کاهش اسپرم وکاهش کیفیت اسپرم که میتواند باعث نازائی و ناباروری درمردان شود ودر ضمن واریکوسل میتواند باعث کوچک شدن بیضه ها شود. واریکوسل ۹۰درصد در سمت چپ و۸درصد دوطرفه و۲درصد در سمت راست بوجود می آید. درسنین ۱۵تا۲۵سالگی بیشترین احتمال بروز واریکوسل وجود دارد.

علل:

واریکوسل زمانی رخ میدهد که دریچه های درون رگ ها درامتداد طناب اسپرمی جلوی جریان خون را گرفته وکارایی آن را مختل می کنند این مشکل باعث برگشتن خون به بالا ودر نتیجه ورم وپهن شدن رگها میشود.



واریکوسل

شیریان ، کارشناس پرستاری

واحد آموزش پرستاری

منبع : کتاب مرجع پرستاری برونر



شماره پمفلت :

خرداد ۱۴۰۱ بازنگری خرداد ۱۴۰۲

۳- روز بعد از ترخیص حمام برود وپانسمان را بردارد ومحل بخیه را با شامپو بچه بشوید ونیاز به پانسمان مجدد نمی باشدولی اگر خواستید میتوانیدیک عدد گاز استریل روی محل بخیه ها گذاشته وروز بعد آن را بردارید.

۴-شورت تنگ بپوشید.

۵-درصورت بروز تب بالای ۳۸-قرمزی بخیه ها و ترشح از محل زخم جراحی هرچه سریعتر به پزشک معالج یا اورژانس بیمارستان مراجعه نمائید.

۶-از خوردن غذاهای که باعث یبوست میشود کمتر استفاده شود و بیشتر از غذاهای فیبر دار مثل سبزیجات ومیوه جات تازه استفاده نمائید.

۷-پس از عمل جراحی طبق دستور پزشک جهت ویزیت مجدد وکشیدن بخیه ها به مطب یا کلینیک بیمارستان مراجعه نمایید.

منابع: برونر داخلی جراحی

عوارض:

۱-کوتاه مدت شامل :درد-عفونت-خونمردگی اطراف ناحیه عمل

۲-بلند مدت:عود واریکوسل یا ایجاد هیدروسل (جمع شدن مایع اطراف بیضه ها)- کوچک شدن بیضه ها کمتر از ۱درصد.

توجه:

نتیجه درمان از ۲ماه بعد از عمل جراحی مشخص می شود بعد از این مدت میتوان با آزمایش اسپرمو گرام از نتیجه عمل مطلع شد.

آموزش های بعد از ترخیص:

۱-دارو های تجویز شده توسط پزشک معالج را تهیه وطبق دستور مصرف کنید.

۲-درد وسوزش وخارش مختصرناحیه عمل جراحی طبیعی بوده وبا داروی مسکنی که دکتر تجویز کرده برطرف میشود.