

## چست تیوب

### (لوله گذاری قفسه سینه):

در عمل تنفس، وجود کمی مایع در فضای بین ریه ها و قفسه سینه، به حرکت ریه ها بدون سایش در حین تنفس کمک می کند اما ورود کمی از هوا، خون و یا چرک ناشی از آسیب و یا در حین عمل جراحی، به فضای جنب، میتواند از اتساع کامل ریه ها جلوگیری نماید. چسبندگی کامل و یا نسبی ریه ها تنفس را با مشکل مواجه کرده و میتواند منجر به توقف تنفسی شود و قرار دادن یک چست تیوب به سرعت به راحتی بیمار کمک می کند. اگر به هر دلیلی مثل تصادفات مقداری هوا یا خون وارد این فضا شود از باز شدن ریه جلوگیری میکند و باعث قطع تنفس می شود که با قرار دادن این لوله پلاستیکی باعث تنفس راحت بیمار می شود.

## روش لوله گذاری قفسه سینه:

لوله قفسه سینه یا چست تیوب یک لوله پلاستیکی است که به یکی ظرف شیشه ای وصل می شود که برای خارج کردن خون و هوای موجود در ریه بکار می رود. گذاشتن این لوله ممکن است در اتاق عمل سرپایی یا در اتاق عمل توسط جراح تحت بی حسی موضعی انجام شود. که نیازی به بیهوشی نیست با استفاده از این بی حسی در قفسه سینه و با برشی کوچک لوله قفسه سینه را وارد فضای جنب می نماید بعد لوله را در جای خود بخیه زده و محل را پانسمان می کنند. قبل از انجام این کار شما توضیح داده می شود که آرامش خود را حفظ کنید.

در طول انجام این کار از حرکت های ناگهانی و سرفه و تحرک پرهیزید. بعد از گذاشتن لوله، شما تحریک به سرفه ناگهانی می شوید که طبیعی است و خود بخود برطرف می شود. بعد از انجام این کار برای جلوگیری از عفونت باید آنتی بیوتیک مصرف نمایید. به خاطر داشته باشید که از دراز کشیدن روی لوله خوداری کنید. سرفه و تنفس عمیق شما باعث عملکرد بهتر تنفسی شما می گردد. در صورتی که بخواهید از روی تخت جابجا شوید باید لوله را با استفاده از گیره ی آن، کلمپ کنید (ببندید). همیشه به خاطر داشته باشید که ظرف حاوی ترشحات (بطری) باید پایین تر از محل گذاشتن لوله باشد.




## ( لوله گذاری قفسه سینه) چست تیوب

تهیه کننده: بخش جراحی  
با همکاری واحد آموزش  
منبع: کتاب مرجع پرستاری برونر



شماره پمفلت: ۱۲۶

خرداد ۱۴۰۱ تا بازنگری خرداد ۱۴۰۲



## قبل از خروج چست تیوب:

برای شما از داروهای مسکن جهت جلوگیری از درد استفاده می شود. ابتدا بخیه ها کشیده می شود بعد شما یک نفس عمیق می کشید و باید تا لحظه خارج کردن لوله توسط پزشک، نفس خود را نگه دارید. بعد محل پانسمان می گردد. این پانسمان تا سه روز نباید تعویض گردد.

در صورت خیس شدن پانسمان یا خارج شدن هر نوع چرک موضوع را به پرستار یا پزشک خود اطلاع دهید. چون ممکن است علامت عفونت و یا باز شدن زخم باشد.

به هیچ وجه پانسمان محل لوله قفسه سینه را تا معاینه مجدد توسط پزشک باز نکنید.